



ЗАО «МОСАГРОГЕН»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Россельхознадзора
Непоклонов Е.А
4 ноября 2006 г

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата ОКСИТЕТРАМАГ®

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Окситетрамаг® (Oxytetramag).
2. Окситетрамаг® - лекарственный препарат, содержащий в качестве действующего вещества антибиотик окситетрациклин.
3. В 1 мл препарата содержится 100 мг окситетрациклина.
4. Представляет собой вязкую прозрачную жидкость коричневого цвета.
5. Выпускают в форме раствора для инъекций, расфасованным по 5, 10, 20, 50 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. На каждую единицу фасовки наносят название организации-производителя, её адрес и товарный знак, название препарата, объём в мл, наименование и содержание действующего вещества, номер серии, срок годности, условия хранения, способ применения, надписи «Для животных», «Стерильно», обозначение стандарта организации и снабжают инструкцией по применению.

Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5⁰С до 25⁰С. Список Б. Срок годности - 2 года со дня изготовления. Запрещается использовать препарат после окончания срока его годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Окситетрациклин - антибиотик широкого спектра действия. Нарушает синтез белка на рибосомах бактерий. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе спирохет. Не активен в отношении протей, синегнойной палочки, большинства грибов и вирусов. При внутримышечном введении хорошо всасывается и быстро проникает во все органы и ткани. Окситетрациклин из организма выводится в основном с мочой.
7. Препарат малотоксичен для теплокровных животных в рекомендованных дозах. Препарат согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам 3 класса опасности - вещества умеренно опасные.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

8. Препарат применяют для лечения пневмонии, бронхопневмонии, метритов, маститов, инфекций мочеполовой системы, энтеритов и гастроэнтеритов, хламидиоза и пастереллёза, бактериальных артритов у крупного рогатого скота, свиней, овец и лошадей.
9. В зависимости от выбранной лечебной дозы (таблица 1) терапевтическая концентрация антибиотика сохраняется в течение 24 или 48 часов (продолженное действие). Лечение может проводиться по одной из схем:
 - препарат вводят внутримышечно (медленно) один раз в сутки из расчета 0,3 - 0,8 мл на 10 кг массы тела животного. Продолжительность лечения 3-7 дней;
 - препарат вводят внутримышечно из расчета 1,0 - 2,0 мл на 10 кг массы тела. Через 48 часов инъекцию повторяют. Курс лечения составляет 3-4 введения.

Таблица 1

Вид животных	Разовая доза, мл/10кг массы тела	
	Действие в течение 24 часов	Действие в течение 48 часов
Телята	0,8	2,0
Крупный рогатый скот	0,3 - 0,5	1,0
Лошади	0,5	не рекомендуется
Свиньи	0,5	1,0
Поросята	0,8	2,0
Овцы и ягнята	0,8	2,0

10. Крупному рогатому скоту не рекомендуется вводить в одно место более 20 мл препарата, свиньям - 10 мл, овцам - 5 мл.
11. Не рекомендуется смешивать с препаратами, содержащими соли кальция.
12. Противопоказанием к применению служит индивидуальная повышенная чувствительность животных к окситетрациклину. Не рекомендуется вводить животным с почечной недостаточностью и самкам во вторую половину беременности.
13. В случае побочных реакций или анафилактического шока применять адреналин, кортикостероиды и антигистаминные препараты в рекомендованных дозах.
14. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 день после последней обработки препаратом. Мясо животных, вынуждено убитых до истечения указанного срока, может быть использовано после термической обработки для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки.
15. Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 7 суток после последней инъекции препарата, запрещается использовать для пищевых целей и можно использовать только на корм животным после термической обработки.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

16. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.
17. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Регистрационный номер ПВР-2-4.6/01758



**Производитель: ЗАО "Мосагроен",
117545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.1
www.mosagroen.ru
тел/факс: (495) 744-06-45 (многоканальный)**



Банковские реквизиты: ЗАО "Мосагроен", ИНН 5009002474,
р/с 40702810600000000007 в ОАО МКБ "Дом-Банк" г. Домодедово,
к/с 30101810400000000593, БИК 044552593, ОКОНХ 19310, ОКПО 18009711