

Инструкция рассмотрена и одобрена
на Ветбиофармсовете
«19» марта 2014 г.
Протокол № 71.

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного препарата «Окситетрациклин-фарм»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Окситетрациклин-фарм (Oxytetracyclinum-pharm)

1.2 В 1,0 г препарата содержится 0,4 г окситетрациклина гидрохлорида и 0,6 г наполнителя.

Препарат представляет собой однородный порошок желтого цвета.

1.3 Окситетрациклин-фарм выпускается в полимерной таре, полиэтиленовых пакетах, двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 100, 500 и 1000 г и мешках бумажных многослойных по 5; 10; 20; 25 кг.

1.4 Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 2°C до плюс 30°C.

Срок годности препарата 2 (два) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 В препарате «Окситетрациклин-фарм» в качестве активнодействующего вещества является окситетрациклина гидрохлорид, относящийся к производным антибиотикам тетрациклического ряда. Механизм действия препарата основан на его подавление биосинтеза белка микробной клетки на уровне рибосом.

2.2 Антибактериальный эффект препарата установлен в отношении грамположительных бактерий (стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий и листерий), грамотрицательных бактерий (кишечной палочки, сальмонелл, клебсиелл, иерсиний, гемофильных бактерий, пастерелл, актинобациллусов, бордепелл), хламидий, спирохет, риккетсий и микоплазм.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Окситетрациклин-фарм» назначается для профилактики и терапии следующих заболеваний у животных и птиц.

3.2 «Окситетрациклин-фарм» применяется внутрь один раз в сутки.

Крупному рогатому скоту и свиньям препарат применяют:

- при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, клостридиозе, дизентерии, leptospirose, хламидиозе, риккетсиозе, клебсиеллезе, иерсиниозе, гемофилезном полисерозите в дозе 25-50 мг препарата на кг массы тела 4-5 дней подряд с кормом или питьевой водой.

Птице препарат применяют:

- при септицемии, сальмонеллезе, стафилококкозах, стрептококкозах, микоплазмозе и др. препарат применяют в дозе 50-125 мг препарата на кг массы тела с кормом или питьевой водой.

Пушным зверям (норка, лисица, песец), **собакам** препарат применяют:

- при колибактериозе, сальмонеллезе, псевдомонозе, пастереллезе, стафилококковых инфекциях, leptospirose препарят применяют в дозе 50-75 мг препарата на кг массы тела 4-5 дней подряд.

Кроликам препарат применяют:

- при пастереллезе, энтеротоксемии, энтеритах, дизентерии, респираторных инфекциях, листериозе, эндометrite, насморке, родентиозе и т.д. препарат применяют в дозе 50-125 мг препарата на кг массы тела с кормом или питьевой водой.

С профилактической целью назначается половина лечебной дозы в течение 3-5 дней.

3.3 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.

3.4 После применения препарата в исключительно редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции и дисбактериоз. Сверхчувствительным животным нужно сразу применить адреналин, антигистаминные препараты, кофеин, препараты кальция и при необходимости - кортикостероиды.

3.5 В случае осложнений (расстройство общего состояния, наличие выраженных клинических признаков и т.д.) или неэффективности применение препарата прекращают.

3.6 Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллина, полимиксина и препаратами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния. Не использовать для лечения животных с дистрофическими поражениями печени.

Не допускается применение препарата курам-несушкам.

3.7 После обработки препаратом мясо от крупного рогатого скота, свиней, овец, кур не допускается к употреблению в течение 14 дней. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

Молоко, полученное от животных в период применения препарата и в течение 2 суток после последнего введения антибиотика, запрещается использовать для пищевых целей. Такое молоко используется для кормления животных.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Во время применения препарата следует соблюдать правила личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

4.2. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 СП «Ветинтерфарм» ООО, Республика Беларусь, 220033 г. Минск, ул. Серафимовича, 13-25

Инструкция по применению препарата разработана в СП «Ветинтерфарм» ООО, РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАНБ» и УО «Витебская Государственная академия ветеринарной медицины» (П.А.Красочки, Ю.Г.Зелютков, Н.Г.Толкач, В.А.Машеро, Л.Л.Жук).

