



ЗАО «МОСАГРОГЕН»

**ИНСТРУКЦИЯ  
по применению СУПРИМИЦИНА®  
для лечения животных при болезнях  
бактериальной этиологии**

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя  
Россельхознадзора  
Власов Н.А.  
24 марта 2009 г.

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Супримицин® (Suprimycin) – лекарственное средство, содержащее в 1 мл раствора гентамицина 20 мг, сульфадиметоксина 200 мг, триметопrimа 40 мг, вспомогательные вещества и воду для инъекций.
2. Препарат представляет собой прозрачную жидкость бледно-желтого цвета.
3. Препарат выпускают в форме раствора для инъекций, расфасованным по 20 или 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы укупоривают резиновыми пробками и укрепляют алюминиевыми колпачками. Каждый флакон маркируют с указанием: организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия лекарственного средства, объёма во флаконе, названия и содержания действующих веществ, номера серии, срока годности, условий хранения, надписи «Для животных», «Стерильно», способа введения, обозначения стандарта организации, информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации и снабжают инструкцией по применению.

Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 °C до 25 °C. Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. Запрещается использовать Супримицин® по истечении срока его годности.

**II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

4. Антимикробное действие Супримицина® обусловлено входящими в его состав компонентами: гентамицином, сульфадиметоксином и триметопримом. Гентамицин, принадлежащий к группе аминогликозидов, оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные микроорганизмы и аэробные грамположительные кокки. Антимикробный спектр препарата расширен за счёт действия сульфаниламида и триметопrimа, направленного на грамположительные и грамотрицательные кокки и большую часть грамотрицательных бацилл.
5. Препарат по степени воздействия на организм теплокровных животных относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

**III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

6. Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при бактериальных инфекциях дыхательных путей (пневмонии, бронхопневмонии, бронхите), диарее, дизентерии, колибациллозе, энтерите, септицемии, метритах и эндометритах, маститах, паротитах, пиелите, пиелонефрите, цистите, уретрите, пастереллезе, кожных инфекциях, актиномикозах, гнойных абсцессах, злокачественном отёке.

7. Препарат вводят внутримышечно из расчёта 1 мл на 10 кг массы тела животного, каждые 12-24 ч в течение 3-5 дней, но не более:
  - крупный рогатый скот - 40 мл;
  - свиноматки и молодняк крупного рогатого скота - 20 мл;
  - поросы, овцы, телята - 10 мл
  - поросы (5-8 недель) 2-3 мл
  - поросы (3-5 недель) ягнята, собаки 1-2 мл
  - поросы (0-3 недели), кошки 0,5-1 мл
8. В особых случаях, по рекомендации ветеринарного врача, длительность лечения можно увеличить до 7 и более дней.
9. Не рекомендуется применять препарат животным с почечной недостаточностью и самкам во вторую половину беременности.
10. У отдельных животных может возникать раздражение на месте введения препарата. В случае побочных реакций или анафилактического шока необходимо применять адреналин и антигистаминные препараты в соответствие с их инструкциями по применению.
11. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 30 дней после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей после термической обработки.
12. Запрещается использовать для пищевых целей молоко, полученное от животных в период лечения Супримицином® и в течение 4 суток после прекращения применения препарата. Такое молоко может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

#### **IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

13. При работе с Супримицином® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
14. Тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей.
15. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

*Регистрационный номер ПВР -2-11.8 / 02344*



Производитель: ЗАО "Мосагроген",  
117545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.1  
[www.mosagrogen.ru](http://www.mosagrogen.ru)  
тел/факс: (495) 744-06-45 (многоканальный)

5

Банковские реквизиты: ЗАО "Мосагроген", ИНН 5009002474,  
п/с 4070281060000000007 в ОАО МКБ "Дом-Банк" г. Домодедово,  
к/с 3010181040000000593, БИК 044552593, ОКОНХ 19310, ОКПО 18009711