

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора

Н.А.ВЛАСОВ

16.07.2018



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Уротропин®

(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген»,
Московская область, 142000, г. Домодедово, Кутузовский проезд. д.10-77)

Номер регистрационного удостоверения: 41-3-12.12-0949NПВР-3-6.6/01821

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Уротропин® (Urotropine).

Международное непатентованное наименование: метенамин (гексаметилентетрамин).

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Уротропин® в качестве действующего вещества содержит в 1 мл гексаметилентетрамин - 400 мг, а также воду для инъекций.

3. Уротропин® по внешнему виду представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия флакона неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.

4. Уротропин® выпускают расфасованным по 10, 20 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Уротропин® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Уротропин® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Уротропин® относится к фармакотерапевтической группе антибактериальных препаратов для системного использования (АТХ J01XX).

10. Гексаметилентетрамин оказывает мочегонное действие, повышает проницаемость мембран клеток, ускоряя тем самым выведение токсинов из

организма. В кислой среде, особенно почек и мочевыводящих путей, гексаметиленetetрамин расщепляется на формальдегид и аммиак, которые проявляют антибактериальное действие.

Выделение гексаметиленetetрамина и его метаболитов с мочой начинается через 40-60 минут после введения и продолжается в течение 6-12 часов.

Уротропин[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Уротропин[®] назначают в качестве антибактериального, антитоксического и диуретического средства при воспалении почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей у крупного рогатого скота и свиней. Лекарственное средство используют при интоксикациях и токсикоинфекциях с целью ускорения выведения токсинов из организма. Уротропин[®] применяют также в комплексной терапии при лечении эндометритов и маститов с признаками интоксикации у коров.

12. Противопоказанием к применению служит гиперчувствительность к гексаметиленetetрамину, дегидратация, почечная и печёночная недостаточность.

13. При работе с лекарственным препаратом Уротропин[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Уротропин[®] нельзя применять в период беременности и лактации, а также новорожденным животным.

15. Уротропин[®] применяют внутривенно (свиньям в ушную вену) 2 - 3 раза в сутки в следующих дозах: крупному рогатому скоту 1,5 – 2 мл на 10 кг массы тела, свиньям 0,5 – 0,7 мл на 10 кг массы тела. Длительность применения зависит от характера и тяжести протекания заболевания, но не должна превышать 4 дней.

16. При применении Уротропина[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных, как правило, не наблюдается.

17. Симптомы передозировки не выявлены.

18. Применение Уротропина[®] не исключает использование других лекарственных средств.

В мочевых путях крупного рогатого скота действие гексаметилентетрамина выражено слабее из-за щелочной реакции мочи. В этом случае необходимо назначать вещества, сдвигающие реакцию мочи в кислую сторону, например, аскорбиновую кислоту.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы курс лечения необходимо возобновить в предусмотренной дозе и схеме применения.

21. Мясо животных, после применения Уротропина[®], может быть использовано в пищу людям не ранее, чем через сутки. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Применение молока в пищу людям разрешается через сутки после последнего введения Уротропина[®]. Молоко, полученное от коров во время лечения, используется в корм животным после кипячения.

С согласованием настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция, утвержденная Россельхознадзором 22.09.2016 г.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ЗАО «Мосагроген»
Российская Федерация,
117545, г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д.
1.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя.

ЗАО «Мосагроген»,
Российская Федерация,
Московская обл., 142000,
г. Домодедово,
Кутузовский пр., д.10-77.
тел. 8 (495) 744-06-45.

Зам. Генерального директора
ЗАО «Мосагроген»



И.А. Казакова